

Preparaat: Homatropine HBR 2% oogdruppels flacon 5 ml

Artikelnummer: 90050185

Z-index: 16030893

Bijsluiter

Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Homatropine oogdruppels wordt gebruikt voor oogonderzoeken. Homatropine zorgt ervoor dat de pupillen verwijden en verhindert dat het oog accommodeert.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen zullen vanzelf weggaan. Voorbeelden zijn wazig zien, irritatie van het oog, lichtschuwheid en gezwollen oogleden.

De volgende bijwerkingen ontstaan als het medicijn via uw ogen in uw bloed komt. U kunt dit proberen te voorkomen door na het druppelen de traankanaaltjes in de ooghoek een paar minuten dicht te drukken. Zie hiervoor rubriek 'Hoe moet ik dit middel gebruiken?'

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

- Hoofdpijn.
- Blozen.
- Droge mond.
- Hartkloppingen.
- Moeilijk plassen.
- Duizeligheid.
- Verwardheid.
- Koorts.

Zeer zelden

- Plotselinge hevige pijn in het oog door **een toename van de oogboldruk**. Neem onmiddellijk contact op met een arts bij plotselinge hevige oogpijn, een rood oog en het zien van kringen rondom lichtpunten.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Gebruik bij andere ziekten of klachten

Als u het **syndroom van Sjögren** heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal kunt u meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de

Preparaat: Homatropine HBR 2% oogdruppels flacon 5 ml

Artikelnummer: 90050185

Z-index: 16030893

aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

- **Was uw handen** met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
- Als u **contactlenzen** draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiters van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u eventueel na 15 minuten toedienen van de druppels weer indoen, tenzij uw oogarts anders heeft geadviseerd.
- Schud zo nodig het flesje voor gebruik, zie etiket.
- Neem plaats op een stoel of een bank.
- Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant.
- Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
- Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
- Buig het **hoofd achterover** en kijk recht omhoog.
- Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.
- Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
- Knijp in het flesje en laat één **druppel in het gootje vallen**.
- Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw **oog dicht**.
- De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het **traankanaaltje** in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen **één minuut dicht**. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw oog.
- Doe uw oog weer open.
- Draai, na gebruik, de **dop** weer op het flesje.
- **Was uw handen** nogmaals met water en zeep.

Vindt u het lastig de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhelp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

Wanneer?

Operatie of onderzoek: vaak moet u 2 tot 3 dagen voor het onderzoek met deze druppels beginnen.

Hoelang?

Preparaat: Homatropine HBR 2% oogdruppels flacon 5 ml

Artikelnummer: 90050185

Z-index: 16030893

Dosis vergeten of teveel gebruikt?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding

1.1 Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?

Deze druppels verminderen het zicht. Rijdt daarom geen auto zolang u hier last van heeft. Het effect van één druppel houdt maximaal 4 dagen aan en neemt dan langzaam af.

1.2 Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

1.3 Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

1.4 Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

- Sommige oogdruppels tegen glaucoom gaan het effect van homatropine tegen. Overleg met uw oogarts welke druppels u samen kunt gebruiken.
- Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens drie minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppel en vanaf drie minuten daarna pas de oogzalf of ooggel. Als u twee soorten oogdruppels gebruikt: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.

Twijfelt u eraan of één van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?

Preparaat: Homatropine HBR 2% oogdruppels flacon 5 ml

Artikelnummer: 90050185

Z-index: 16030893

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?

Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken:

- Wanneer u overgevoelig bent voor boorzuur en/of benzalkoniumchloride.
- Wanneer u glaucoom heeft.

Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in een keer met dit medicijn stoppen. De spieren in het oog zullen dan weer aanspannen.

Realiseer u dat de effecten op het oog nog een paar dagen kunnen voortduren. U kunt dus nog langere tijd last hebben van fel licht en wazig zien.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Homatropine oogdruppels FNA bevatten per ml 20 mg homatropinehydrobromide. Verder bevatten de oogdruppels boorzuur en benzalkoniumchloride.

Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaar de oogdruppels beneden de 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. De oogdruppels zijn dan houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. Nadat het flesje is aangebroken zijn de oogdruppels 1 week houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruikstermijn die op de verpakking staat. U kunt op de verpakking noteren wanneer u deze heeft geopend.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

Preparaat: Homatropine HBR 2% oogdruppels flacon 5 ml

Artikelnummer: 90050185

Z-index: 16030893

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.